

车前草、马蔺、紫苏、薄荷、野珊瑚、野芥菜、野菊花、野苋菜、野绿豆、铁扫帚、沙气菜、野艾、蕻艾、艾、木香、石灰菜、水菊花、夏枯草、蒿草等是平原草滩上常见的草类。这些草类都是耕牛的天然饲料,有的还是可入人们餐桌的野菜,有的可作中药材。草木藤类植物有五瓜龙、野毛豆、豆泡草等。平原湿地(包括沼泽和水塘)常见的草类有稗草、剪刀草、野芋、金钱草、黄家草、菖蒲、野茭笋等。水塘与河中有溪藻(分圆扁两种)、湖皮(萍)、菱角、鸡头莲、圆叶萍、四瓣萍、水麻藤等。丘陵山地草类以稷箕、蕨萁、丝毛草、葭茅为多,也兼有部分耐旱的平原野草。藤类有葛藤、野葡萄、金银花、凉粉子藤等。

灌木类 平原低丘地区有黄荆、臭椿、大青、栀子花、春了花(杜鹃)、枸杞、紫荆、山楂、刺柏、野蔷薇、金英子、木槿花、继树、大叶小竹、黄竹、苦竹等。丘陵山地除上述灌木外,还有野柿子、茶子树、檀树、毛栗、楮树、箬竹、水竹、罗汉竹、金竹等。

乔木类 乐平原生常见树种有樟树、松树、枫树、荷树、栎树、楮树、苦楝、杨树、杨梅、野梨、酸枣、达树、栲树等。

菌类 平原低丘地区常见的野生菌类植物有冻菇、霉菌、胭脂菇、满山白、花菇、炭菇等。山地地区除上述菌类之外,还有灰菇、灵芝。

兽类 乐平 60 年代还有虎(华南虎)的足迹,猎户偶有猎获老虎的。现在平原低丘地区常见的野兽有豺狗、狼、野猫、狐狸、黄鼠狼、刺猬、兔子、獾(有猪獾、狗獾两种)、田鼠、蝙蝠、老鼠等。山区除此之外,还有豹(极稀少)、猴子、獐、鹿、野猪、豪猪等。

鸟类 乐平常见的鸟类有麻雀、黄雀、铁嘴雀、画眉、山雀、斑鸠、野鸡(雉)、竹鸡、老鹰、猫头鹰、猴面鹰、猎鹰、八哥、乌鸦、喜鹊、翠鸟、布谷、燕子、白鹭、水鸭等。70 年代以后,城区鸟类逐年锐减,老鹰最先绝迹,乌鸦、喜鹊已远去,麻雀也很稀少。

鱼及两栖类、蛇类 常见的原生鱼种有鲤鱼、鳊鱼、鳊鱼、鲫鱼、乌鱼、鲢鱼、黄牙头、黄沾鱼、白鱼、杆鱼、晚鱼、鲢鱼、黄鳊、刀鳊、黄鳊、米虾、河虾、螃蟹、田蚌、河蚌、田螺、石螺、团鱼、乌龟、青蛙、石鸡、癞蛤蟆等。60 年代乐安河中还可看到河豚,现已绝迹。常见的蛇类有松花蛇、水蛇、棋盘蛇、眼镜蛇、竹节斑、麻七寸等。

昆虫及爬虫类 常见的有蝴蝶、黄蜂、马蜂、吊脚蜂、蜻蜓、螳螂、知了、纺织娘、蟋蟀、蚂蚁、响虫、蜈蚣、蝎子、蜥蜴、壁虎、草鞋虫、斑蝥、百脚虫、蚯蚓等。

第八节 自然灾害

乐平自然灾害以水、旱灾害为最盛,几乎每年都有不同程度的危害。风灾时有发生,会造成重大财产损失和人畜伤亡。农作物、林木病虫害、家畜家禽传染病很频繁,但一般都能较好地防治,因此影响不是太大。

水灾 乐平是水灾多发区,每年汛期都有不同程度的洪涝发生,此处只记灾情较大的。

1987 年 4 月 22 ~ 23 日,全县普降暴雨,洪水猛涨,县城最高水位达到 23.72 米(吴淞基面),超过警戒线 1.17 米。

1992 年 6 月 21 ~ 22 日,乐平境内 24 小时降雨 104.2 毫米,洪水猛涨,虎山水文站水位超过警戒线 0.19 米。

1993 年 7 月 6 日特大洪水,虎山水文站水位为 29.33 米,超警戒线 3.33 米,城区坝口水位 25.98 米,超警戒线 3.48 米。全境有接渡、浯口、勘上、礼林 4 处堤防决口,24 个乡镇受灾,大批