

水利工程、公路及桥涵被冲毁。不少低洼地带受洪水浸泡达 20 天之久,造成交通中断、工矿企业停产。

1994 年 6 月 18 日大洪水,虎山水文站水位涨至 29.02 米,超警戒线 3.02 米;市区坝口水位达 25.6 米,超警戒线 3.18 米。

1995 年 6 月 2 日~3 日乐安河(含大支流)中上游连降暴雨,酿成大洪灾。6 月 4 日 5 时,虎山水文站水位 29.02 米,超警戒线 3.02 米,市区坝口水位 26.00 米,超警戒线 3.5 米。安殷水流域(洵田、礼林)灾情最重,8.1 万人遭灾,死亡 4 人。

1997 年 7 月 9 日大洪水成灾,虎山水文站水位 30.01 米,超警戒线 4.01 米;市区坝口水位 26.33 米,超警戒线 3.83 米。

1998 年 6 月 17~7 月 24 日境内发生两次大洪水,7 月 24 日虎山水文站洪水位高达 30.326 米,超警戒线 4.32 米;市区坝口水位为 26.69 米,超警戒线 4.19 米,形势十分危急。27 日第六次洪峰更大,镇桥塘湖段圩堤溃决,洪水倒灌,加上鄱阳湖水顶托,洪水持续不退,致使镇桥镇平原地区田地和村庄、3 万多人口在洪水中浸泡了 60 天。206 国道韩家渡至万年段交通中断 2 个月之久。其他沿河乡镇也有多处浸泡在洪水中。

1999 年 8.28~8.31,出现百年未遇的秋汛,两次洪水袭境,28 日虎山水文站洪水位超警戒线 0.89 米,31 日超 0.87 米。

旱灾 市域内夏秋之交,受单一海洋气团的强烈影响,高温少雨,几乎每年都有不同程度的干旱影响晚稻生产、油菜播种。由于灌溉设施齐全,能够及时缓解旱情,一般都不会产生严重灾害。1985~2000 年 16 年中旱情比较严重的有两次:一次是 1999 年 9 月 6 日~10 月 30 日 55 天中降水仅 5.8 毫米,旱情严重,对油菜播种、晚稻生长影响很大;另一次是 2000 年 7 月干旱严重,实施人工增雨作业,缓解旱情。

风灾 1986 年 4 月 10 日下午 3 时 40 分~6 时,境内南部接渡、众埠等乡镇遭受 11 级暴风雨和冰雹袭击,95 幢房屋和大批室外通讯、输电设施被毁,死 6 人、伤 15 人,还有部分猪、牛被压死。

1988 年 3 月 14 日 7~8 时,涌山、科山等 9 乡遭龙卷风袭击,上万农户损失很大。6 月 11 日晚上洵田乡遭受雷雨大风袭击。

1992 年 5 月 6 日傍晚,雷电暴风雨袭击高家、众埠、接渡、礼林、镇桥等 15 个乡镇,吹倒民房 1251 间,致 2 人死亡,31 人受伤,户外输电、通讯设施损失严重,其中有 7 台变压器遭雷击损坏。家畜、林木、农作物损失也很大。

1998 年 8 月 17 日傍晚 6 时 30 分大风暴袭击浯口、接渡、礼林、乐港、镇桥、观峰等乡镇,民房、输电线路有多处倒塌和损坏,村民有多人受伤。

农作物病虫害 1985 年 6~7 月境内发生暴发性早稻颈瘟病,受灾面积约 16 万亩。

1987 年 6 月,境内出现稻飞虱危害晚稻灾害,影响面积 12 万亩,重灾面积 5000 亩。

1991 年 7 月,镇桥、乐港等地出现棉铃虫为害,受灾棉花约 2000 亩,损失较重的有 420 亩。

1993 年 8~9 月,境内晚稻发生大面积三化螟危害,波及面积达 30 万亩,损失较重的有 15000 亩。

1994 年 9 月,境内发生稻飞虱危害晚稻灾害,波及面积达 80000 亩,损失较重的有 2000 亩。

1995 年,境内发生棉铃虫为害,受灾面积 21000 亩,损失严重的 450 亩。