

据县实验场多年饲养观察和解剖测定,乐平花猪具有六大生理特性:一是生性温驯,饱后爱眠,适应性强,长江中下游均适宜养殖;二是生长快,日增重均在八两上下;三是繁殖性能好,实验场统计一百六十窝仔猪,平均每窝产仔一十二点八头,断奶窝重均在二百五十斤左右;四是肉脂兼用,肉质细嫩鲜美;五是胴体瘦肉多,屠宰率高,瘦肉率占百分之四十九,屠宰率达百分之七十五(另据江西省科学院实验资料载,乐平花猪经三元杂交后,瘦肉率已增至百分之五十六点七九);六是抗病力强,仔猪出栏前,注射一次预防针,嗣后基本安全无恙。

为了改良猪种,本县从1952年到1983年,先后从省、地农牧良种场引进过约克夏猪二百二十四头,长白猪五十六头,巴克夏猪十头,克米洛夫猪十四头。现今本县饲养的猪种,多是以乐平花猪为母本与这些引进的种公猪杂交的。杂交仔猪个体大,生活力强,断奶窝重高。塔前公社新园大队高圳村陈元福家,一头乐花母猪与长白公猪杂交一代所产仔猪十一头,断奶全重高达四百四十五点五斤。

1986年6月3日,南斯拉夫马其顿共和国普里大学农学院教授彼宅尔·耐舍夫斯基等到本县考察乐平花猪后说:“乐平花猪虽貌不惊人,个儿不大,但产仔多,味鲜肉嫩,作为杂交母体,潜力很大。”

牛 本县役用牛有水牛、黄牛。水牛多属滨湖牛系,个体高大,能负重;黄牛则属长江中下游耐热牛系,个体较小,韧力强。1982年全县二万八千五百零七头耕牛中,有水牛二万零七百三十四头,占百分之七十二点七三;黄牛七千七百七十三头,占百分之二十七点二七。

水牛繁殖为三年两头,黄牛为一年一头。1949年至1982年,全县共繁殖小牛十八万七千零五头。

一头好水牛通常能负担耕种面积二十五亩上下,一般水牛也能负担二十亩左右。黄牛好的能负担二十亩,一般黄牛为十五亩左右。

1957年至1965年,本县先后从省农牧良种繁殖场引进过荷兰杂种奶牛一百三十头。1981年,又从上饶市奶牛场购进奶母牛五头,公牛一头。

鸡 本县农家养的鸡,多属杂交土鸡。城镇郊区和工矿区以及新近几年兴起的养鸡专业户,则养殖引进良种鸡较多。

1952年至1965年,本县先后引进澳洲黑鸡二百七十只,来亨鸡八百零四只,洛岛红鸡一百八十只。1960年后,又从广东、江苏、浙江、安徽等地引进过白洛克、红考来西、九斤黄、萧山鸡,新白鸡、罗斯鸡、星杂二八八、星波罗等。县种禽场试养对比记载表明,引进鸡中,肉用鸡以新白鸡为最佳,主要优点是含蛋白质高,长速快,一般六十天就可长到二至三斤;蛋用鸡以罗斯鸡和来亨鸡为最好,其优点是年产蛋二百二十个至二百六十个,产蛋不歇窝。这几种鸡已列为县种禽场重点推广鸡种。

鸭 本县农村饲养的鸭,多属湖北型麻鸭。饲养数量,1951年为一万九千九百四十只,1961年为五万七千三百二十二只,1971年为六万四千一百四十八只,1981年为十二万六千六百二十四只。后港乡观山村,从1978年以来,每年土法孵化鸭苗二十余万只,远销闽、浙、皖等省。1984年,勘上乡余家村养鸭专业户余天世购进一百十五只“康贝尔”鸭,饲养一百一十天就开始产蛋,而且不换毛,不歇窝,既可放养又可圈养。

蜜蜂 本县蜜蜂原为中蜂,而且饲养量不多,民国末期仅四百一十八桶,1956年引进